

ORALSONE® CAMELOS

Lea con cuidado esta información antes de utilizar este medicamento

¿QUE CONTIENE ORALSONE C?

Cada caramelo contiene como ingredientes activos: Tirotricina 1 mg; Benzocaina 5 mg.
Ingredientes inactivos: Esencia de manzana, Caramelo base c.s.p. 2,5 g.
(Caramelo base: composición: Azúcar 70% y Jarabe de Glucosa 30%).

ACCIÓN

Antiséptico bucofaríngeo con acción anestésica.

¿PARA QUÉ SE USA ORALSONE C?

ORALSONE C se utiliza para el alivio temporario del dolor y la inflamación de boca y garganta. No usar en niños menores de 12 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ORALSONE C?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de sus componentes.
No emplee este producto simultáneamente con otros tratamientos para la boca o garganta. No usar en niños menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted es diabético, está recibiendo otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
Si el dolor de garganta es severo o se acompaña de dificultad en la respiración.
Si el dolor de garganta se acompaña o es seguido de fiebre, dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón, náuseas o vómitos.
No utilizar en casos de lesiones muy extensas en boca o garganta.
En todos los casos, consulte a su médico antes de comenzar a usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si se presenta dolor de cabeza, hinchazón de las encías, en la boca o garganta, deseos de vomitar y/o fiebre, consulte con su médico.
Si el dolor, ardor, o la llaga o afta, o la lesión empeora o persiste luego de 2 días, consulte a su médico.
Este medicamento produce habitualmente una disminución transitoria de la sensibilidad normal de la lengua y la boca, por lo cual se recomienda usar lejos de las comidas.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

Posología y Forma de administración:

- Adultos y mayores de 12 años: dejar disolver lentamente un caramelo en la boca, en contacto con la lesión, cada 2 a 3 horas, según la intensidad de los síntomas. Dosis máxima en las 24 horas: 6 caramelos.

Debido a que la Benzocaina puede provocar anestesia en la zona de la garganta, los caramelos deben administrarse lejos de las comidas.

No se debe exceder la dosis máxima diaria de 6 caramelos.
Recuerde que este es un medicamento y no una golosina.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMO MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

En caso de una sobredosis, concurra al Hospital más cercano o llame por teléfono a un centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de Asistencia médica o comuníquese con alguno de los siguientes centros:

- HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
- HOSPITAL R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247
- HOSPITAL DE PEDIATRÍA DR. GARRAHAM: (011) 4941-8650
- HOSPITAL DE CLÍNICAS GRAL. DE SAN MARTIN: (011) 4961-6001

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A ORALSONE C?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 0800 444 72666
O, en caso necesario al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0800 333 1234.

IMPORTANTE:

"Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico".

"Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños".

"No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase"

"Mantenga el producto en su envase original y conserve el prospecto".

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 9 caramelos.

CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco, entre 15 y 25°C.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD
CERTIFICADO N°: 47.173

Elaborado en Gral. Manuel A. Rodríguez 2830 (C1416CNJ),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alvaro Barros 1113 (B1838CMC) Luis Guillón, Buenos Aires.

GRAMON MILLET S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de Buenos Aires.
Directora Técnica: Julia García Buhlman - Farmacéutica.

FECHA DE ULTIMA REVISION: Octubre 2015

Contenido 9 caramelos - VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA

