

ORALSONE COMPRIMIDOS HIDROCORTISONA

Contenido 12 comprimidos

VENTA BAJO RECETA - INDUSTRIA ARGENTINA

FÓRMULA: Cada comprimido contiene:

Hemisuccinato de hidrocortisona 2,5mg.

Excipientes: Lactosa; Azúcar; Acido esteárico, Mentol; Povidona.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiinflamatorio esteroide de uso tópico.

INDICACIONES: Aftas, llagas y ulceraciones bucales.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/PROPIEDADES:

Acción Farmacológica: La hidrocortisona disminuye las respuestas tisulares a los procesos inflamatorios. Inhibe la acumulación de células inflamatorias, la fagocitosis, la liberación de enzimas lisosómicas y la síntesis y liberación de diversos mediadores químicos reduciendo los síntomas de la inflamación.

Farmacocinética: Aún cuando el producto se aplica tópicamente sobre las lesiones, se absorbe por vía digestiva. La mayor parte se metaboliza principalmente en el hígado a metabolitos inactivos. Se elimina por metabolismo y ulterior excreción renal de los metabolitos activos.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: ORALSONE debe dejarse disolver lentamente en la boca sin masticarlo, colocándolo y tratando de mantenerlo en el lugar más próximo a la lesión. En caso de ulceraciones múltiples es aconsejable el cambio de posición del comprimido.

Dosis: Dejar disolver lentamente en la boca un comprimido, tres a cuatro veces por día.

REACCIONES ADVERSAS: No se han descripto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Aunque la dosis de hidrocortisona es baja, debe reverse la eventual aparición de efectos sistémicos.

Diabéticos: Puede aumentar la concentración de glucosa en sangre.

Embarazo: Solo indicar luego de evaluar potenciales riesgos y beneficios tanto para la madre como para el feto.

Lactancia: No debe administrarse a las madres en el período de lactancia. En caso de resultar imprescindible, debe suspenderse la misma.

Conservar a temperatura entre 15°C - 30°C.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto. Lesiones micóticas, virales o tuberculosas de la cavidad bucal o del aparato digestivo. Ulcera gastroduodenal activa.

INTERACCIONES: El uso simultáneo con analgésicos no esteroides (AINE) puede aumentar el riesgo de úlcera o hemorragia gastrointestinal.

SOBREDOSIS: Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con algunos de los siguientes Centros de Toxicología:

Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.

PRESENTACIÓN: ORALSONE envase con 12 comprimidos. Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 26.214

Elaborado en Int. A. Avals 4208 (B1605ECT),

Munro, Buenos Aires.

GRAMON MILLET S.A.

Fray J. Sarmiento 2350 (B1636AKJ) Olivos.

Provincia de Buenos Aires, Argentina.

DIRECTORA TÉCNICA: Julia García Buhlman. Farmacéutica.

Fecha de última revisión: Febrero 2008

Atención al consumidor: 0800-44-472666