

ORALSONE

GEL ANESTÉSICO *Alivio del dolor*
BENZOCAÍNA 20%

Dolores dentales, lesiones por uso de brackets y ulceraciones.
Analgésico - Anestésico Tópico Bucal
Contenido Neto: 10 g. - **Venta Libre - Industria Argentina**

¿QUÉ CONTIENE ORALSONE BENZOCAÍNA?

Cada 100 g de gel contiene como ingrediente activo:
Benzocaína 20 g. Ingredientes inactivos: Polietilenglicol; Glicerina;
Carbómero 934P; Hidróxido de sodio; Esencia de
menta; Sacarina sódica; Metilparabeno; Propilparabeno; Azul
brillante; Amarillo de quinolina; Agua purificada.

ACCIÓN: Anestésico tópico.

¿PARA QUÉ SE USA ORALSONE BENZOCAÍNA?

Alivio temporario del dolor de muelas o relacionado a la aparición de
lagas y/o ulceraciones de la mucosa bucal.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ORALSONE BENZOCAÍNA?

NO USE este medicamento si es menor de 18 años o si fuese alérgico
a alguno de sus ingredientes o a los anestésicos tipo "caínas"
(Procaina, Novocaína, Butacaína, etc.).

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE APLICARME ESTE MEDICAMENTO?

Si esta embarazada o amamantando a su bebé consulte a su médico
antes de aplicarse este medicamento. Use solo en mucosa bucal. No
debe ser aplicado en otras partes del cuerpo. Evitar contacto con los
ojos. Se han reportado casos de metahemoglobinemia tras el uso
de Benzocaína.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ME ESTOY APLICANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si el dolor, enrojecimiento o molestias persisten o empeoran luego
de 7 días de tratamiento, o si aparece hinchazón o fiebre, consultar
con el médico u odontólogo. Evite el contacto con los ojos.
Suspenda el uso y consulte al médico si aparecen síntomas de
debilidad, confusión, dolor de cabeza, dificultad para respirar y/o
piel color pálida, grisácea o azulada, ya que pueden ser síntomas de
metahemoglobinemia.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.
Posología y forma de administración:
Adultos y mayores de 18 años: Aplicar la cantidad necesaria de gel
para cubrir adecuadamente la lesión o lesiones dolorosas, 4 veces al

día, lejos de las comidas. Puede emplearse hasta 6 veces por día, si
las lesiones son muy molestas. En las lesiones de las encías causadas
por prótesis se debe retirar la misma, aplicar el gel y esperar hasta
que el dolor o la molestia hayan calmado lo suficiente. A
continuación, enjuague bien la cavidad bucal con agua y vuelva a
colocar la prótesis.

ORALSONE BENZOCAÍNA puede aplicarse hasta 7 días
consecutivos, si fuese necesario.

Importante: Debido a que la Benzocaína puede provocar anestesia
en la zona de la garganta, debe aplicarse lejos de las comidas, para
evitar que los alimentos puedan aspirarse inadvertidamente.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA INGESTIÓN ACCIDENTAL O SI ME APLIQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

DIRÍJASE AL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA MÁS CERCANO O
COMUNIQUESE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE
INTOXICACIONES:

- HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 o 4658-7777
- HOSPITAL R. GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 o 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A ORALSONE BENZOCAÍNA?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:
0800 444 72666 o, en caso necesario al teléfono de ANMAT
RESPONDE: 0800 333 1234.

IMPORTANTE:

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.
Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del
alcance de los niños. No utilizar luego de la fecha de vencimiento
indicada en el envase. Mantenga el producto en su envase original y
conservar el prospecto.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 10 g.

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura menor a 30 °C.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD.

CERTIFICADO N°: 48.780.

Elaborado en Int. A. Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Pcia. de Buenos
Aires.

GRAMON MILLET S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Directora Técnica: Julia García Buhlman - Farmacéutica.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: Mayo 2015

3131904846
GM13331224
3/L74

