

ORALSONE MAX TOPIC

Anestésico y antibiótico bucal
BENZOCAÍNA – TIOTRICINA
Indicado en aftas, llagas y lesiones bucales

Venta Libre – Industria Argentina
SOLUCIÓN ORAL SPRAY

¿QUÉ CONTIENE ORALSONE MAX TOPIC?:

Cada 100 mililitros de spray contiene:

Ingredientes activos: Benzocaína 5,0 gramos; Tiotricina 0,1 gramos.

Ingredientes inactivos: Esencia de menta; Mentol; Sacarina sódica; Anethol; Metilparabeno; Glicerina; Propilenglicol; Alcohol etílico; Agua purificada c.s.p. 100,000 mililitros. Este medicamento contiene 40 % p/v de alcohol.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.

ACCIÓN: Anestésico y antibiótico de uso tópico bucal.

¿PARA QUÉ SE USA ORALSONE MAX TOPIC?:

Lea detenidamente esta información: **ORALSONE MAX TOPIC** está indicado para el alivio del dolor, molestias y otros síntomas de afecciones leves de la boca tales como aftas, llagas, lesiones por prótesis defectuosas o uso de brackets e inflamación de las encías. Uso Externo.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR ORALSONE MAX TOPIC?:

No use este medicamento si: Tiene antecedentes de alergia local a la Benzocaína y/o a la Tiotricina, o alergia a cualquier otro componente de la fórmula de **ORALSONE MAX TOPIC**.

No utilizar este producto en menores de 12 años de edad, embarazo o lactancia.

Este medicamento contiene alcohol etílico, por lo que no deberá ser utilizado en pacientes que sufran enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazo y niños.

No usar en pacientes bajo tratamiento con Disulfiram.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?:

No exceder la dosis recomendada. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?:

A las dosis y tiempos de tratamiento recomendados, **ORALSONE MAX TOPIC** es muy bien tolerado.

Eventualmente se puede experimentar hormigueo de lengua y boca.

En tratamientos con dosis muy altas o en tratamientos muy prolongados se puede observar infección con otras bacterias u hongos y la posibilidad de algún tipo de reacción alérgica (reacciones de hipersensibilidad).

Si la afección local se acompaña de fiebre elevada y/o náuseas y vómitos, o si aparecen nuevos síntomas o el cuadro no mejora al cabo de 3 días de tratamiento, interrumpir el mismo y consultar con el médico.

No es conveniente utilizar conjuntamente con otros antisépticos para la boca.

Siga estrictamente las normas de aplicación y las dosis aconsejadas.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?:


Lea detenidamente esta información.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Mayores de 12 años: Se debe efectuar una previa higiene bucal, enjuagando la boca con agua tibia. La aplicación de **ORALSONE MAX TOPIC** se puede repetir hasta 4 veces al día, a intervalos regulares (1 aplicación cada 6 horas). Cada aplicación contiene 0,11 ml de producto. Coloque **ORALSONE MAX TOPIC** con su aplicador directo a la zona del dolor.

No debe enjuagarse la boca luego de la aplicación.

La primera vez que utilice **ORALSONE MAX TOPIC** debe accionar el aplicador 3 ó 4 veces hasta que se observe un spray fino; de esta manera el producto estará listo para ser utilizado.



¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI INGERÍ POR ERROR ORALSONE MAX TOPIC?:

Dirijase al centro de asistencia médica más cercano o comuníquese con alguno de los siguientes centros de intoxicaciones:

- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
- Hospital R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó 4962-2247

PRESENTACIONES: Envase conteniendo 20 ml.

Elaborado en Álvaro Barros 1113 (B1838CMC)
Luis Guillón, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S. A. – Fray J. Sarmiento 2350 (B1636AKJ) –
Olivos – Prov. de Buenos Aires – Argentina.
DIRECTORA TÉCNICA: Julia García Buhlman – Farmacéutica.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud –
Certificado N°: 47.173

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A ORALSONE MAX TOPIC?:

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 0 800 444 72666.

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0800 333 1234.

IMPORTANTE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 06/2017